

Vragenlijstgebruik in de Psychomotorische Therapie (PMT): Onderzoeksresultaten

DE ONDERZOEKSPOPULATIE



Diverse groep psychomotorisch therapeuten (sept 2025 - feb 2026)



Meerderheid deelnemers, gemiddelde leeftijd 33,05 jaar

Algemeen Gebruik



66,7%
(14 therapeuten)

Gebruik is niet de standaard
Gebruiken momenteel geen vragenlijsten




33,3%
(7 therapeuten)

Zetten ze wel in
Bij zowel kinderen als jongeren

INSTRUMENTEN PER DOELGROEP

KINDEREN (7-12 jaar)

Vragenlijst #1



Boosheid lichamelijke signalenlijst (50%)



Observatie Psymot (100%)

JONGEREN (12-16 jaar)

Vragenlijst #1




Boosheid lichamelijke signalenlijst (66,7%)

Vragenlijst #2



CBCL (50%)

Vragenlijst #3



LAV, MAIA-2, of SLCS-R (33,3%)



Observatie ABC-movement Test

TIMING VAN HET GEBRUIK



100%

Start bij aanvang
Indien gebruikt, zet iedere therapeut deze in bij de start



50%

Herhaling bij afsluiting

Ongeveer de helft herhaalt de meting (57,1% bij kinderen, 42,9% bij jongeren) om voortgang te meten

ouders en derden

Child Behavior Checklist (CBCL) is het meest gebruikte instrument voor input vanuit de omgeving